

# 12. Tollerabilità degli psicofarmaci in gravidanza

## Antidepressivi

Per il presente argomento non sono state identificate revisioni sistematiche di studi randomizzati, pertanto non sono state prodotte tabelle GRADE. La raccomandazione è stata formulata sulla base della seguente letteratura.

### **Bibliografia**

Patil AS, Kuller JA, Rhee EH. Antidepressants in pregnancy: a review of commonly prescribed medications. *Obstetrical and Gynecological Survey* 2011; 66: 777-787.

Reis M, Kallen B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. *Psychological Medicine* 2010; 40: 1723-1733.

Riggin L, Frankel Z, MD, Moretti M, Pupco A, Koren G. The fetal safety of fluoxetine: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada* 2013; 35: 362–369.

Stephansson O, Kieler L, Haglund B, Artama M, Engeland A, Furu K, Gissler M, Norgaard M, Nielsen RB, Zoega H, Valdimarsdottir U. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors during pregnancy and risk of stillbirth and infant mortality. *JAMA* 2013; 309 : 48-54.

Udechuku A, Nguyen T, Hill R, Szego K. Antidepressants in pregnancy: a systematic review. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry* 2010; 44: 978-996.

# Antipsicotici

Per il presente argomento non sono state identificate revisioni sistematiche di studi randomizzati, pertanto non sono state prodotte tabelle GRADE. La raccomandazione è stata formulata sulla base della seguente letteratura.

## **Bibliografia**

Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. *Schizophrenia Bulletin* 2010; 36: 518–44.

Habermann F, Fritzsche J, Fuhlbrück F, Wacker E, Allignol A, Weber-Schoendorfer C, Meister R, Schaefer C. Atypical antipsychotic drugs and pregnancy outcome: a prospective, cohort study. *Journal of Clinical Psychopharmacology* 2013; 33: 453-62.

NICE. Antenatal and Postnatal Mental Health. National Clinical Practice Guideline 45. National Institute for Health & Clinical Excellence 2007.

# Benzodiazepine

Per il presente argomento non sono state identificate revisioni sistematiche di studi randomizzati, pertanto non sono state prodotte tabelle GRADE.  
La raccomandazione è stata formulata sulla base della seguente letteratura.

## **Bibliografia**

Bellantuono C, Imperadore G. Gli psicofarmaci in gravidanza e nell'allattamento. Il pensiero scientifico editore, Roma 2005.

Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM, Power JD, Koren G, Einarson TR. Benzodiazepine use in pregnancy and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. *British Medical Journal* 1998; 26: 839-43.

Gentile S. Neurodevelopmental effects of prenatal exposure to psychotropic medications. *Depression and Anxiety* 2010; 27: 675-86.

Grover S, Avasthi A, Sharma Y. Psychotropics in pregnancy: weighing the risks. *Indian Journal of Medical Research* 2006; 123: 497-512.

Iqbal MM, Sobhan T, Ryals T. Effects of commonly used benzodiazepines on the fetus, the neonate, and the nursing infant. *Psychiatric Services* 2002; 53: 39-49.

NICE. Antenatal and Postnatal Mental Health. National Clinical Practice Guideline 45. National Institute for Health & Clinical Excellence 2007.

# Stabilizzatori dell'umore

Per il presente argomento non sono state identificate revisioni sistematiche di studi randomizzati, pertanto non sono state prodotte tabelle GRADE. La raccomandazione è stata formulata sulla base della seguente letteratura.

## **Bibliografia**

Bellantuono C, Imperadore G. Gli psicofarmaci in gravidanza e nell'allattamento. Il pensiero scientifico editore, Roma 2005.

Galbally M, Roberts M, Buist A; Perinatal Psychotropic Review Group. Mood stabilizers in pregnancy: a systematic review. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2010; 44: 967-77.

Gentile S. Lithium in pregnancy: the need to treat, the duty to ensure safety. Expert Opinion on Drug Safety 2012; 11: 425-37.

Gentile S. Neurodevelopmental effects of prenatal exposure to psychotropic medications. Depression and Anxiety 2010; 27: 675-86.

NICE. Antenatal and Postnatal Mental Health. National Clinical Practice Guideline 45. National Institute for Health & Clinical Excellence 2007.